

10/500, 173
06/24/04

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP02/13683

REC'D 03 MAR 2004
26.12.02
WIPO PC

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年12月28日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-402102

[ST.10/C]:

[JP2001-402102]

出 願 人

Applicant(s):

科学技術振興事業団


PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 2月12日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3006525

【書類名】 特許願

【整理番号】 B08P01

【提出日】 平成13年12月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C12N 15/79

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府池田市菅原町 3 - 1 - 1 0 0 4

 【氏名】 高橋 克仁

【発明者】

 【住所又は居所】 奈良県生駒市光陽台 1 5 1

 【氏名】 山村 倫子

【特許出願人】

 【識別番号】 396020800

 【氏名又は名称】 科学技術振興事業団

 【代表者】 沖村 憲樹

【代理人】

 【識別番号】 100107984

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 廣田 雅紀

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 044347

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 0013099

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 細胞特異的発現複製ベクター

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域を所定の遺伝子上流に組み込んだ成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターにおいて、前記細胞特異的発現複製ベクターに存在するチミジンキナーゼ (Thymidine kinase) 遺伝子を利用して所望の時期にその複製を抑制しうることを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 2】 細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域が、配列番号 1 に示される塩基配列を含む領域であることを特徴とする請求項 1 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 3】 配列番号 1 に示される塩基配列を含む領域が、配列番号 2 に示される塩基配列からなるヒトカルポニン遺伝子プロモーターを含む領域であることを特徴とする請求項 2 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 4】 配列番号 2 に示される塩基配列を含む領域が、配列番号 3 に示される塩基配列を含む領域であることを特徴とする請求項 3 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 5】 細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域が、配列番号 1、配列番号 2 又は配列番号 3 に示される塩基配列において、1 若しくは数個の塩基が欠失、置換若しくは付加された塩基配列からなり、かつ転写開始制御活性を有する塩基配列を含む領域であることを特徴とする請求項 1 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 6】 転写開始制御領域の上流にエンハンサーが組み込まれていることを特徴とする請求項 1～5 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 7】 エンハンサーが 4 F 2 エンハンサーであることを特徴とする請求項 6 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 8】 所定の遺伝子のさらに下流に、所定の遺伝子とは異なる目的

タンパク質をコードするDNAが連結され、前記転写開始制御領域の制御下に目的タンパク質を発現することを特徴とする請求項1～7のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項9】 目的タンパク質をコードするDNAが、IRES (internal ribosomal entry site)を介して所定の遺伝子に連結されていることを特徴とする請求項8記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項10】 目的タンパク質をコードするDNAが、アポトーシス関連遺伝子であることを特徴とする請求項1～9のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項11】 目的タンパク質をコードするDNAが、血管新生抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAであることを特徴とする請求項1～9のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項12】 目的タンパク質をコードするDNAが、癌転移抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAであることを特徴とする請求項1～9のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項13】 目的タンパク質をコードするDNAが、癌抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAであることを特徴とする請求項1～9のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項14】 所定の遺伝子が、ウイルス複製関連遺伝子であることを特徴とする請求項1～13のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項15】 ウイルス複製関連遺伝子が、ICP4又はE1Aであることを特徴とする請求項14記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項16】 発現複製ベクターが、ウイルスベクターであることを特徴とする請求項1～15のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項17】 ウイルスベクターが、単純ヘルペスウイルスベクター (HSVベクター) 又はアデノウイルスベクターであることを特徴とする請求項16

記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 18】 腫瘍細胞特異的、腫瘍新生血管の増殖平滑筋特異的、増殖性血管病変における増殖平滑筋特異的、糸球体腎炎における増殖メサンギウム細胞特異的、又は線維症における増殖筋線維芽細胞特異的な発現複製ベクターであることを特徴とする請求項 1～17 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 19】 リボヌクレオチドリダクターゼ (Ribonucleotide reductase) をコードする DNA を欠失していることを特徴とする請求項 1～18 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター。

【請求項 20】 請求項 1～19 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織に導入し、発現複製させることを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現複製方法。

【請求項 21】 請求項 1～19 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織に導入し、発現複製させ、その後の所望の時期に、細胞特異的発現複製ベクターの発現複製を抑制することを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現複製・抑制方法。

【請求項 22】 細胞特異的発現複製ベクターの発現複製の抑制が、アシクロビル (aciclovir)、ガンシクロビル (ganciclovir) 等の抗ウイルス薬を用いることによる抑制であることを特徴とする請求項 21 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現複製・抑制方法。

【請求項 23】 請求項 1～19 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織に導入し、発現複製させて前記細胞特異的発現複製ベクターによるチミジンキナーゼ活性を測定することを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの生体内分布を検出する方法。

【請求項 24】 チミジンキナーゼ活性の測定が、 ^{124}I でラベルしたウラ

シル誘導体 F I A U を用いる Positron Emission Tomography による測定であることを特徴とする請求項 23 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの生体内分布を検出する方法。

【請求項 25】 生体細胞組織が、腫瘍組織、血管またはリンパ管狭窄組織、腎炎組織又は線維症組織であることを特徴とする請求項 20～24 のいずれか記載の方法。

【請求項 26】 請求項 1～19 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを含むことを特徴とする治療薬。

【請求項 27】 悪性腫瘍、線維症、増殖性血管病変又は増殖性糸球体腎炎に対する治療薬であることを特徴とする請求項 26 記載の治療薬。

【請求項 28】 請求項 1～19 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、肺、肝臓などの線維症組織または乳がん、胃がん、膵臓がんなどの悪性腫瘍組織に導入し、ベクターの複製と遺伝子、蛋白およびペプチドの発現によって、増殖筋線維芽細胞を選択的に破壊することを特徴とする線維症及び悪性腫瘍の治療方法。

【請求項 29】 請求項 1～19 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、血管またはリンパ管の狭窄組織あるいは動脈硬化組織、糖尿病性網膜症組織に導入し、ベクターの複製と遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現によって、増殖平滑筋細胞又は血管周細胞を選択的に破壊することを特徴とする増殖性血管病変の治療方法。

【請求項 30】 請求項 1～19 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、腎炎組織に導入し、ベクターの複製と遺伝子、タンパク質又はペプチドを発現させ、増殖メサングウム細胞を選択的に破壊することを特徴とする増殖性糸球体腎炎の治療方法。

【請求項 31】 所望の時期に、細胞特異的発現複製ベクターの発現複製を抑制することを特徴とする請求項 28～30 のいずれか記載の治療方法。

【請求項 32】 細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域が活性化され得る細胞又は該遺伝子を発現する細胞に、請求項 1～19 のいずれか記載の細胞特異的発現複製ベクターを含む相同組み換え後のウイルス混合液を感染させ

、ベクター内に組み込んだ遺伝子の発現を指標にして、アガロースゲルオーバーレイ法を用いず、限界希釈法によって単一クローンにまで精製することを特徴とする細胞特異的発現複製ベクターの製造方法。

【請求項 3 3】 細胞が、ICP 4（－）細胞であることを特徴とする請求項 3 2 記載の細胞特異的発現複製ベクターの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、特定の細胞に特異的に遺伝子を発現させ自己複製する成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター、特にその発現複製後の所望の時期に発現複製を抑制することができる細胞特異的発現複製ベクター、更には前記ベクターを用いて、特定の生体細胞で遺伝子を発現する方法、あるいは特定の細胞を破壊する方法等に関し、詳しくは、（１）癌の遺伝子治療分野において、特定の癌細胞そのものあるいは腫瘍内新生血管の増殖平滑筋細胞を特異的に破壊するために、遺伝子の発現を細胞特異的に行い得る発現複製ベクターを作製し、正常細胞には傷害を与えることなく治療を可能とし、治療終了後、ベクター感染細胞を完全に除去することができる安全性の高い細胞特異的発現複製ベクターの構築や、（２）肺や肝臓などの線維症に対する遺伝子治療の分野において、増殖筋線維芽細胞を特異的に破壊するために、遺伝子の発現を細胞特異的に行い得る発現複製ベクターを作製し、正常細胞には傷害を与えることなく治療を可能とし、治療終了後、ベクター感染細胞を完全に除去することができる安全性の高い細胞特異的発現複製ベクターの構築や、（３）ステント留置後や臓器移植後の血管狭窄や動脈硬化症、糖尿病性網膜症などの遺伝子治療分野において、増殖血管平滑筋細胞を特異的に破壊するために、遺伝子の発現を細胞特異的に行い得る発現複製ベクターを作製し、正常細胞には傷害を与えることなく治療を可能とし、治療終了後、ベクター感染細胞を完全に除去することができる安全性の高い細胞特異的発現複製ベクターの構築や、（４）糸球体腎炎の遺伝子治療の分野において、増殖メサングウム細胞を特異的に破壊するために、遺伝子の発現を細胞特異的に行い得る発現複製ベクターを作製し、正常細胞には傷害を与えることなく治療を可能

とし、治療終了後、ベクター感染細胞を完全に除去することができる安全性の高い細胞特異的発現複製ベクターの構築等に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

正常細胞には影響を与えず、癌細胞のみを選択的に傷害することができる、副作用の少ない理想的な癌の治療法が近年求められている。その一つとして遺伝子治療法が挙げられるが、かかる治療法は癌細胞に導入する遺伝子の細胞選択性や発現プロモーターの活性、ウイルスベクターの感染導入法など、いろいろなレベルで癌細胞選択性を高めることが可能であり、将来の有望な治療法として注目されている。しかし、すべての癌細胞において治療遺伝子を導入できないという共通の問題がある。一方、癌の免疫細胞療法も、正常組織にもわずかながら組織特異的分化抗原の発現が認められることから、正常細胞に対する副作用が問題となっている。また、突然変異に基づく癌抗原は、個々の癌にその変異が限られるという欠点をもっていることから、それを分子標的とした癌の免疫細胞療法として一般化するには適しているとはいえない。

【 0 0 0 3 】

最近、感染と複製によって次々と増殖細胞のみを選択的に傷害する複製可能型単純ヘルペスウイルス（H S V）ベクターを用いた悪性脳腫瘍の遺伝子治療臨床研究が米国と英国で行われている（Gene Ther. 7, 859-866, 2000、Gene Ther. 7, 867-874, 2000）。複製可能型H S Vベクターは、ウイルス複製に必須なRibonucleotide reductase（R R）又はThymidine kinase（T K）を欠失したベクターであり、これらの酵素は正常細胞では増殖時にのみ発現するが、腫瘍細胞では構成的に発現している。そのため、このH S Vベクターは、正常細胞であれ腫瘍細胞であれ増殖の盛んな細胞に感染すると、細胞由来のR RやT Kを利用して複製され細胞溶解活性を示す。一方、国内では動物実験で、前立腺癌や膵臓癌に対する複製可能型H S Vベクターの抗腫瘍効果が報告されている（J. Surg. Oncol. 72, 136-141, 1999）が、これらも細胞選択性がなく、安全性が低い。従って、血液脳関門があり、循環血液中にベクターが拡散しない脳ではヒトの治療に用いることができたが、脳以外の臓器での治療には適さないという問題点があった

【0004】

上記のことから、HSVベクターの傷害活性を標的細胞特異的にコントロールできれば、さらに有効で安全な治療法になると考えられている。これまでに、米国のMartuzaらによって、アルブミンプロモーターを用いた肝腫瘍選択的な複製可能型HSVベクターが報告されている（J. Virol. 71, 5124-5132, 1997）。しかし、かかるベクターを用いると肝細胞癌ではアルブミン遺伝子の発現が低下し、また正常な再生肝細胞をも傷害することなどからヒトでの臨床応用には適さないと考えられている。その他、米国特許第5728379号明細書（「腫瘍あるいは細胞特異的単純ヘルペスウイルスの複製」）では、中皮腫に対する応用の可能性を述べているが、平滑筋肉腫や骨肉腫、消化管ストローマ腫瘍（GIST）などのヒトの肉腫全般、腫瘍血管、増殖性血管病変、増殖性糸球体腎炎、肺、肝臓等の線維症あるいは悪性腫瘍の間質で増殖する筋線維芽細胞に対する治療への応用可能性の記述はなされていない。

【0005】

肉腫の病因と病態に関する遺伝子解析により、一部の腫瘍でp53とRbの変異や融合遺伝子の存在が報告されているが、まだ広く治療に応用できる段階に至ってはいない。ヌードマウスを用いた動物実験で、Milasらは複製能を持たないアデノウイルスベクターを用いて平滑筋肉腫細胞にp53遺伝子を導入し、腫瘍の増殖遅延効果があることを報告している（Cancer Gene Ther. 7, 422-429, 2000）。その他、オステオカルシン遺伝子のプロモーターを用いて、自殺遺伝子であるチミジンキナーゼを骨肉種に導入発現させる方法が報告されている（Cancer Gene Ther. 5, 274-280, 1998）が、これは複製能を欠失したウイルスベクターを用いたものであり、遺伝子導入の効率が悪く、骨肉腫以外の肉腫には適用できない。特に、Milasらの報告では、本発明者らによる報告（Cancer Res. 61, 3969-3977, 2001）に記載されているのと同じ、ヒト平滑筋細胞株SK-LMS-1を用いた実験例を示しているが、上記報告において使用したウイルスベクターの粒子量の100～1000倍多くのウイルス粒子を使用し、効果は上記報告におけるものよりも劣っている。従って、Milasらの結果は、体内に注入するウイルス粒子の

数をできるだけ少なくして副作用を押さえるという観点から、好ましいとは言えない。

【0006】

また、癌の血管新生抑制療法としては、米国のFolkmanのグループによるマウスの実験系で、アンジオスタチンやエンドスタチンなどのペプチド性抑制因子の劇的な抗腫瘍効果が報告されている (Cell 79, 315-328, 1994、Cell 88, 277-285, 1997)。我国においても中村らによって、肝細胞増殖因子の分子内断片であるNK₄の血管新生抑制作用が報告されている (Biochem. Biophys. Res. Commun. 279, 846-852, 2000)。しかしこれらの方法は、大量のペプチドを必要とすること、エンドスタチンに関しては再現性が低いという報告があること、作用メカニズムが不明であること、さらにヒトでの有効性がまだ確認されていないこと、などの問題点がある。現在臨床試験中の血管新生阻害剤は、細胞選択性がなく、阻害効率も低い。米国のChereshらが報告した、内皮細胞の表面のインテグリンの作用を阻害するペプチドも同様に細胞選択性がなく、阻害効率が低い (J. Clin. Invest. 103, 1227-1230, 1999)。これらの研究は、すべて血管内皮細胞を標的にした治療であるが、腫瘍血管を構成する増殖血管平滑筋細胞を標的にした細胞選択的治療剤は未だ知られていない。実際、平滑筋細胞の増殖と遊走を促進する血小板由来増殖因子受容体の拮抗剤が強力な腫瘍新生血管抑制作用をもつことが報告され (Cancer Res. 60, 4152-4160, 2000)、腫瘍血管新生を抑制するために血管平滑筋を攻撃することの重要性が推測されるが、この方法は細胞非選択的であり、副作用も予想される。

【0007】

また、増殖性血管病変特に、ステント留置後や心臓移植後の血管狭窄に対しては、新生内膜の平滑筋増殖を抑制する種々の薬剤が試みられているが、いずれも狭窄の予防には成功していない。最近の遺伝子治療の試みとしては、複製能を欠くアデノウイルスベクターを用いて、カルボニンの相同遺伝子であるSM22 α のプロモーターの制御下にLacZ遺伝子をバルーン傷害後のラット頸動脈の平滑筋細胞に選択的に導入したLeidenらの報告がある (J. Clin. Invest. 100, 1006-1014, 1997)。しかし、この実験ではLacZ遺伝子が導入されたのは、標

的細胞である内膜の増殖平滑筋ではなく中膜の平滑筋で、導入効率も極めて低いものであった。また、Nabelらも複製能のないアデノウイルスベクターを用いて SM 2 2 α のプロモーターの制御下に Lac Z 遺伝子を CAT (chloramphenicol acetyltransferase) 遺伝子をブタの動脈に導入する実験を行ったが、内膜の平滑筋細胞の 2. 2 %、中膜平滑筋細胞の 0. 5 6 % に遺伝子発現が認められたにすぎなかった (Mol. Med. 6, 983-991, 2000)。一方、複製可能型 HSV ベクターを用いてバルーン傷害後のラット頸動脈に感染させた宮武らの報告 (Stroke 30, 2431-2439, 1999) では、ウイルスの複製は主に内膜の増殖平滑筋で観察され、複製可能型ウイルスベクターを用いることの有用性が推測されるが、このベクターは細胞非選択的であり、内皮細胞や外膜線維芽細胞の破壊などの副作用も予想される。その他にもデコイやアンチセンス DNA などのオリゴヌクレオチドを血管に直接導入する方法も発表されているが、導入効率が低く、血管平滑筋増殖の十分な抑制効果は期待できない。

【 0 0 0 8 】

また、増殖性糸球体腎炎に対する最近の遺伝子治療の試みとしては、TGF β 1 の阻害作用をもつデコリン (decorin) や TGF β 受容体と IgG Fc 領域のキメラ遺伝子、また NF κ B のデコイをリポソームベクターを用いて腎糸球体に導入する方法が報告されている (Nature Med. 2, 418-423, 1996; Kidney Int. 55, 465-475, 1999; Gene Ther. 7, 1326-1332, 2000) が、この方法は細胞非選択的であり、副作用も予想される。また、腎糸球体に選択的に遺伝子を導入するために、複製能を欠くアデノウイルスベクターをポリスチレンの微小球 (microsphere) に結合させてラットの大動脈に投与する方法が発表されている (Kidney Int. 58, 1500-1510, 2000) が、増殖性糸球体腎炎の原因となるメサンギウム細胞以外に血管内皮細胞にも導入遺伝子の発現が認められ、治療の標的化は未だ不完全である。さらに、アデノウイルスは免疫原性が強く、それ自体が糸球体腎炎の原因となる免疫反応を惹起する危険性も指摘されている (Kidney Int. 61, S85-S88, 1997)。

【 0 0 0 9 】

他方、本発明者らは、ヒト由来の肉腫の腫瘍細胞に平滑筋の分化マーカーとさ

れるカルポニン遺伝子が発現していることを見出し、はじめて報告した (Int. J. Cancer 79, 245-250, 1998, Sarcoma 3, 107-113, 1999, Intern. J. Cancer 82, 678-686, 1999)。その後、骨・軟部肉腫に加えて消化管ストローマ腫瘍 (GIST) や唾液腺肉腫、繊維肉腫、悪性神経鞘腫など 20 種類近い間葉系細胞由来のヒト悪性腫瘍で、カルポニン遺伝子が異常発現していることが国内外で相次いで報告されている。上記カルポニン (h1 又は basic) は、X線結晶構造と、インビトロ及びインビボの機能解析により、アクチン分子の C 末端に結合して、アクチン・ミオシンの滑り運動を抑制することが明らかにされている (Biochem. Biophys. Res. Commun. 279, 150-157, 2000, J. Physiol. 529, 811-824, 2000)。カルポニン遺伝子は、成体では、平滑筋細胞に選択的に発現し、血管の分化のマーカーと考えられている (Physiol. Rev. 75, 487-517, 1995)。

【 0 0 1 0 】

また、上記米国特許第 5 7 2 8 3 7 9 号明細書や本発明者らによる報告 (Cancer Res. 61, 3969-3977, 2001) においては、HSV のチミジンキナーゼ (Thymidine kinase) をコードする DNA を欠失している複製可能型ベクターについて記述されているが、チミジンキナーゼを欠失している HSV は、抗ヘルペスウイルス薬であるアシクロビル (aciclovir) やガンシクロビル (ganciclovir) に対する感受性がなく、これらベクターをヒトの治療に応用する場合には、予期せぬウイルス感染の拡大を防ぐという安全対策の面において問題がないとはいえなかった。

【 0 0 1 1 】

その他、神経細胞での複製に関与する gamma 3 4. 5 遺伝子を 2 コピーとも欠失し、LacZ 遺伝子が Ribonucleotide reductase (ICP 6) - locus に挿入されている複製可能型 HSV-1 ベクター G 2 0 7 (Nature Med. 1, 938-943, 1995) や、CMV プロモーター／エンハンサーによって発現する autofluorescent protein と cytosine deaminase を ICP 6 - locus に相同組換え法で挿入した複製可能型 HSV-1 ベクター HSV 1 y CD (Cancer Res. 61, 5447-5452, 2001) は知られていたが、ともに Ribonucleotide reductase が欠失する結果、増殖細胞でのみ複製可能であるが、細胞選択性をもたない。また、肺や肝臓などの線維症における増殖筋線維芽細胞を標的にして、選択的に破壊する治療

法の報告はない。また、悪性腫瘍の間質で増殖する筋線維芽細胞を標的にした治療法もこれまで報告がない。

【 0 0 1 2 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、悪性腫瘍等の治療に用いるために、悪性腫瘍等の特定の細胞で特異的に遺伝子を発現しつつ複製し、かつ正常細胞には損傷を与えないような、細胞特異的発現複製ベクター、特にその発現複製後の所望の時期に発現複製を抑制することができる細胞特異的発現複製ベクターを構築すること、更には、該ベクターを悪性腫瘍等の特定の生体細胞に導入し発現させて治療する方法などを提供することにある。

【 0 0 1 3 】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究し、特定の腫瘍細胞や平滑筋細胞に特異的に発現するヒトカルボニン遺伝子の該細胞内における転写開始制御領域を取得し、ウイルス複製関連遺伝子の複製開始に必要な転写因子をコードする遺伝子上流に組み込んで、これをウイルスDNAの複製に必須の酵素であるTK遺伝子と置き換えることによって、悪性腫瘍細胞や腫瘍内新生血管の増殖平滑筋細胞等の特定の細胞で該遺伝子を発現させ、ウイルス複製を誘導し得る成人正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを構築した。この構築した細胞特異的発現複製ベクターを悪性腫瘍組織に導入したところ、腫瘍細胞や腫瘍新生血管の増殖平滑筋を選択的に傷害することを報告している（Cancer Res. 61, 3969-3977, 2001；特願2001-143999）。

【 0 0 1 4 】

上記本発明者らが報告したカルボニンプロモーターをもつ複製可能型HSV-1ベクター（Cancer Res. 61, 3969-3977, 2001；特願2001-143999）や、前記米国のMartuzaらによる、アルブミンプロモーターを用いた肝腫瘍選択的な複製可能型HSV-1ベクター（J. Virol. 71, 5124-5132, 1997；米国特許5728379）が、これまでに発表された細胞特異的に複製可能なHSV-1ベクターであるが、どちらもウイルス複製に必須の転写因子であるICP4

をコードする遺伝子を2つとも欠失したHSV-1変異体ウイルスd120を親株とし、プロモーターの上流にLacZ cDNAを、下流にICP4 cDNAを接続し、d120のチミジンキナーゼ (Thimidine kinase) 遺伝子座 (TK-1 locus) に相同組み換えしたものである。したがって、ベクター精製の過程で指標となるLacZ遺伝子の発現はTK遺伝子のプロモーターの制御下にある。

【0015】

かかるチミジンキナーゼをコードするDNAを欠失している複製可能型HSV-1ベクターは、抗ヘルペスウイルス薬であるアシクロビル (aciclovir) やガンシクロビル (ganciclovir) に対する感受性が欠如している。したがって、ベクターを単クローンにまで精製する方法は、相同組み換え後のウイルス混合液をICP4 cDNAを導入したVer o E 5細胞に感染させ、5-ブローモ-4-クロロ-3-インドリル- β -D-ガラクトピラノシド (X-gal) アガロースオーバーレイ法でLacZ遺伝子の発現を示す青色の染色によって、複数、好ましくは少数のプラークを回収し、ガンシクロビル (ganciclovir) の存在下でVer o E 5細胞に再び感染させるというプラーク精製のサイクルを繰り返すことによって行われてきた。抗ヘルペスウイルス薬によってTK-1 locusで組み換えが起こらなかったウイルスすなわちTK遺伝子をもつウイルスを排除する方法は、当然のことながらTK遺伝子をもつ細胞特異的発現複製ベクターの精製には適用することができない。

【0016】

また、X-galアガロースオーバーレイ法は、スクリーニングの初期段階では単一のプラークを回収することは不可能である。さらに、この方法ではアガロースをオーバーレイした時点で、細胞の分裂増殖が停止するとともにウイルスの複製も停止する結果、それ以降はウイルス粒子の数が増加しない。この場合、リボヌクレオチド還元酵素 (Ribonucleotide reductase, RR) 遺伝子のプロモーターなどTK遺伝子のプロモーターより活性の強いプロモーターによって発現されるLacZ遺伝子をもつ複製可能型ベクターでは、ベクター自身の複製能が高くない場合、TK遺伝子のプロモーターによって発現されるLacZ遺伝子をもつ複製可能型ベクターのものと同程度に青色に染色された細胞1個あたりのウイ

ルス数が少ない。そのため、次のスクリーニングに向けて複製能力のあるベクターを回収することが困難である。

【0017】

さらに、細胞特異的発現複製ベクターとして、ICP4 cDNAとIRES (internal ribosomal entry site) の下流に挿入した任意の遺伝子 (蛍光を発するGreen Fluorescent Proteinを発現するcDNAを好適に例示することができる) を連結させると、上記任意の遺伝子を細胞特異的な転写開始制御領域の制御下に発現させ、この任意の遺伝子の発現とLacZ遺伝子の発現の両方を指標にしてスクリーニングすることが可能となり、目的の場所に相同組み換えが起こったウイルスベクターをより確実にしかも迅速に単離することができるとの知見を得た。

【0018】

また、相同組み換え後の最初のスクリーニングに、細胞特異的に発現する遺伝子のプロモーターすなわち転写開始制御領域が活性化され得るICP4 (一) 細胞又は該遺伝子を発現するICP4 (一) 細胞に、細胞特異的発現複製ベクターを含む相同組み換え後のウイルス混合液を感染させ、前記ウイルスを複製・増殖させた後、ベクター内に組み込んだ遺伝子の発現を指標にして、限界希釈法によって単一クローンにまで精製する方法を用いることによって、細胞特異的プロモーターの制御下にICP4を発現するという目的の組み換えが起こったベクターを選別濃縮することができることを見い出した。さらに、チミジンキナーゼを温存した細胞特異的発現複製ベクターは、アシクロビル (aciclovir) やガンシクロビル (ganciclovir) によってその感染細胞とともにウイルスを死滅させることが可能であり、予期せぬウイルス感染の拡大を防ぐという安全対策の面で優れた特性を有しているとの知見を得た。一方、チミジンキナーゼを欠失することを特徴とする細胞特異的複製可能型HSV-1ベクターである米国特許5728379号の発明および先に出願した特願2001-143999号の発明の実施例は、ヒトの治療への応用には適さないとも考えられる。本発明は上記の知見に基づいて完成するに至ったものである。

【0019】

すなわち本発明は、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域を所定の遺伝子上流に組み込んだ成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターにおいて、前記細胞特異的発現複製ベクターに存在するチミジンキナーゼ (Thymidine kinase) 遺伝子を利用して所望の時期にその複製を抑制しうることを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 1) や、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域が、配列番号 1 に示される塩基配列を含む領域であることを特徴とする請求項 1 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 2) や、配列番号 1 に示される塩基配列を含む領域が、配列番号 2 に示される塩基配列からなるヒトカルポニン遺伝子プロモーターを含む領域であることを特徴とする請求項 2 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 3) や、配列番号 2 に示される塩基配列を含む領域が、配列番号 3 に示される塩基配列を含む領域であることを特徴とする請求項 3 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 4) や、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域が、配列番号 1、配列番号 2 又は配列番号 3 に示される塩基配列において、1 若しくは数個の塩基が欠失、置換若しくは付加された塩基配列からなり、かつ転写開始制御活性を有する塩基配列を含む領域であることを特徴とする請求項 1 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 5) や、転写開始制御領域の上流にエンハンサーが組み込まれていることを特徴とする請求項 1～5 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 6) や、エンハンサーが 4 F 2 エンハンサーであることを特徴する請求項 6 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 7) や、所定の遺伝子のさらに下流に、所定の遺伝子とは異なる目的タンパク質をコードする DNA が連結され、前記転写開始制御領域の制御下に目的タンパク質を発現することを特徴とする請求項 1～7 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 8) や、目的タンパク質をコードする DNA が、IRES (internal ribosomal entry site) を介して所定の遺伝子に連結されていることを特徴する請求項 8 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター (請求項 9) や、目的タンパク質をコードする DNA が、アポトーシ

ス関連遺伝子であることを特徴とする請求項 1～9 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 10）や、目的タンパク質をコードする DNA が、血管新生抑制作用をもつタンパク質をコードする DNA であることを特徴とする請求項 1～9 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 11）や、目的タンパク質をコードする DNA が、癌転移抑制作用をもつタンパク質をコードする DNA であることを特徴とする請求項 1～9 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 12）や、目的タンパク質をコードする DNA が、癌抑制作用をもつタンパク質をコードする DNA であることを特徴とする請求項 1～9 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 13）や、所定の遺伝子が、ウイルス複製関連遺伝子であることを特徴する請求項 1～13 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 14）や、ウイルス複製関連遺伝子が、ICP4 又は E1A であることを特徴する請求項 14 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 15）や、発現複製ベクターが、ウイルスベクターであることを特徴とする請求項 1～15 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 16）や、ウイルスベクターが、単純ヘルペスウイルスベクター（HSV ベクター）又はアデノウイルスベクターであることを特徴とする請求項 16 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 17）や、腫瘍細胞特異的、腫瘍新生血管の増殖平滑筋特異的、増殖性血管病変における増殖平滑筋特異的、糸球体腎炎における増殖メサンギウム細胞特異的、又は線維症における増殖筋線維芽細胞特異的な発現複製ベクターであることを特徴とする請求項 1～15 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 18）や、リボヌクレオチドリダクターゼ（Ribonucleotide reductase）をコードする DNA をコードする DNA を欠失していることを特徴とする請求項 1～18 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクター（請求項 19）に関する。

【 0 0 2 0 】

また本発明は、請求項 1～19 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない

細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織に導入し、発現複製させることを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現複製方法（請求項 2 0）や、請求項 1 ～ 1 9 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織に導入し、発現複製させ、その後の所望の時期に、細胞特異的発現複製ベクターの発現複製を抑制することを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現複製・抑制方法（請求項 2 1）や、細胞特異的発現複製ベクターの発現複製の抑制が、アシクロビル（aciclovir）、ガンシクロビル（ganciclovir）等の抗ウイルス薬を用いることによる抑制であることを特徴とする請求項 2 1 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現複製・抑制方法（請求項 2 2）や、請求項 1 ～ 1 9 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織に導入し、発現複製させて前記細胞特異的発現複製ベクターによるチミジンキナーゼ活性を測定することを特徴とする成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの生体内分布を検出する方法（請求項 2 3）や、チミジンキナーゼ活性の測定が、¹²⁴I でラベルしたウラシル誘導体 F I A U を用いる Positron Emission Tomography による測定であることを特徴とする請求項 2 3 記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの生体内分布を検出する方法（請求項 2 4）に関する。

【 0 0 2 1 】

さらに本発明は、生体細胞組織が、腫瘍組織、動脈狭窄組織、腎炎組織又は線維症組織であることを特徴とする請求項 2 0 ～ 2 4 のいずれかに記載の方法（請求項 2 5）や、請求項 1 ～ 1 9 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを含むことを特徴とする治療薬（請求項 2 6）や、悪性腫瘍、線維症、増殖性血管病変又は増殖性糸球体腎炎に対する治療薬であることを特徴とする請求項 2 6 記載の治療薬（請求項 2 7）や、請求項 1 ～ 1 9 のいずれかに記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、肺、肝臓などの線維症組織または乳がん、胃がん、膵臓がんなどの悪性腫瘍組織に導入し

、遺伝子、蛋白およびペプチドを発現させ、増殖筋線維芽細胞を選択的に破壊することを特徴とする線維症及び悪性腫瘍の治療方法（請求項 28）や、請求項 1～19 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、血管狭窄組織または動脈硬化組織、糖尿病性網膜症組織に導入し、遺伝子、タンパク質又はペプチドを発現させ、増殖平滑筋細胞又は血管周細胞を選択的に破壊することを特徴とする増殖性血管病変の治療方法（請求項 29）や、請求項 1～19 のいずれか記載の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、腎炎組織に導入し、遺伝子、タンパク質又はペプチドを発現させ、増殖メサンギウム細胞を選択的に破壊することを特徴とする増殖性糸球体腎炎の治療方法（請求項 30）や、所望の時期に、細胞特異的発現複製ベクターの発現複製を抑制することを特徴とする請求項 28～30 のいずれか記載の治療方法（請求項 31）や、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域が活性化され得る細胞又は該遺伝子を発現する細胞に、請求項 1～19 のいずれか記載の細胞特異的発現複製ベクターを含む相同組み換え後のウイルス混合液を感染させ、ベクター内に組み込んだ遺伝子の発現を指標にして、限界希釈法によって単一クローンにまで精製することを特徴とする細胞特異的発現複製ベクターの製造方法（請求項 32）や、細胞が、ICP4（-）細胞であることを特徴とする請求項 32 記載の細胞特異的発現複製ベクターの製造方法（請求項 33）に関する。

【 0 0 2 2 】

【発明の実施の形態】

本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターとしては、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域を所定の遺伝子上流に組み込んだ成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターにおいて、前記細胞特異的発現複製ベクターに存在するチミジンキナーゼ（Thymidine kinase）遺伝子を利用して所望の時期にその複製を抑制しうるベクターであれば特に制限されるものではないが、腫瘍細胞特異的、腫瘍新生血管の増殖平滑筋特異的、増殖性血管病変における増殖平滑筋特異的、糸球体腎炎における増殖メサンギウム細胞特異的、又は線維症における増殖筋線維芽細胞特異的な発現複製ベクターが好ましく、上記細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域としては、細胞特異的

に発現している遺伝子のプロモーター領域や該プロモーターの一部の領域を挙げることができる、より具体的には、カルボニン遺伝子のプロモーターの-260から-219までの配列番号1に示される塩基配列を含む領域、好ましくは配列番号2に示される塩基配列からなるヒトカルボニン遺伝子プロモーター、より好ましくは配列番号3に示される塩基配列からなるヒトカルボニン遺伝子プロモーターとその構造遺伝子の一部を含む領域を例示することができる。また、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域として、上記配列番号1、配列番号2又は配列番号3に示される塩基配列において、1若しくは数個の塩基が欠失、置換若しくは付加された塩基配列からなり、かつ転写開始制御活性を有する塩基配列、例えばマウス、ラット及びブタ由来のカルボニンプロモーターのそれに相同な領域を含む領域を例示することができる。

【 0 0 2 3 】

上記の他、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域として、増殖平滑筋細胞を攻撃の標的にする場合は、SM22 α 遺伝子のプロモーター領域（ヒトSM22 α 遺伝子では-480から-26までの配列；GenBank accession# D84342-D84344、マウスやラットあるいはその他の哺乳動物由来のSM22 α 遺伝子ではそれに相同な領域）、内皮細胞を標的にする場合は、F1k-1のプロモーター領域又はF1t-1遺伝子など内皮細胞特異的遺伝子のプロモーター領域を用いることができる。これらの場合にも、一部構造遺伝子を含む領域を転写開始制御領域とすることもできる。

【 0 0 2 4 】

上記細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域の上流に、転写を著しく活性化するエンハンサーを連結することが好ましく、かかるエンハンサーとしてはアデノウイルス初期遺伝子のエンハンサー、モロニー Maus 白血病ウイルス末端反復配列のエンハンサー、ヒストンH2A遺伝子エンハンサー、免疫グロブリンエンハンサー、インスリン遺伝子エンハンサー、c-fos遺伝子エンハンサー、T細胞抗原受容体遺伝子エンハンサー、筋型クレアチンキナーゼ遺伝子エンハンサー、ヒト4F2重鎖（ヘビーチェーン）転写エンハンサー等のエンハンサーであれば特に制限されないが、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領

域が、カルボニン遺伝子のプロモーターの-260から+73までの配列を含む領域の場合、アミノ酸トランスポーターの活性化因子であると考えられている膜貫通構造を一回しか持たない二型膜糖タンパク質である4F2ヘビーチェーン遺伝子のエンハンサーであるヒト4F2重鎖転写エンハンサー（配列番号4）等の4F2エンハンサーが転写効率を著しく高めうる点で好ましい。

【0025】

本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの作製に用いられる所定の遺伝子としては、ウイルスの複製の開始又は維持に必要な遺伝子であれば特に制限されるものではなく、例えば、アデノウイルスのE1A遺伝子、ICP6 (Ribonucleotide reductase) 遺伝子などのウイルス複製関連遺伝子を挙げることができ、中でもヘルペスウイルスの複製開始に必要な転写因子をコードする遺伝子 (ICP4) を好適に例示することができる。また、これら遺伝子は、転写開始制御領域の下流に位置する本来の構造遺伝子の一部又は全部と上記所定の遺伝子がインフレームで結合したものでよく、例えば、カルボニン蛋白質のN末側の一部とICP4蛋白質との融合タンパク質をコードするDNAを具体的に挙げることができる。

【0026】

本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターとして、所定の遺伝子のさらに下流に、所定の遺伝子とは異なる目的タンパク質をコードするDNAが連結され、前記転写開始制御領域の制御下に目的タンパク質を発現することができる細胞特異的発現複製ベクター、具体的には、上記目的タンパク質をコードするDNAが、IRES (internal ribosomal entry site; 米国特許第4937190号明細書) を介して所定の遺伝子に連結されている細胞特異的発現複製ベクターを好適に挙げることができる。このIRES部分にカルボニンのホモログであるSM22 α 遺伝子のプロモーターを連結することもできる。かかるヒトSM22 α プロモーター配列は本発明者らが最初にクローニングし、報告しており (J. Biochem. (Tokyo) 122, 157-167, 1997)、プロモーター活性に重要な部分 (ヒトSM22 α プロモーター領域のBamHI-DraI断片445bp) の塩基配列を配列番号5としてしめす。その他、IRESに代えて、CMVプ

ロモーターやCAGプロモーター エンハンサーを用いると、カルボニンのプロモーターの制御から外れ、細胞非選択的に下流の目的タンパク質をコードする遺伝子を発現させることができる。

【0027】

上記目的タンパク質をコードするDNAとしては、アポトーシス関連遺伝子や、血管新生抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAや、癌転移抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAや、癌抑制作用をもつタンパク質をコードするDNA等を挙げることができ、これらは2以上連結してもよい。上記アポトーシス関連遺伝子としては、Bcl-x_s、Bok/Mtd、Bcl-G_s/Bra、Bcl-GL、Bcl-Rambo、Hrk/DP5、Bik/Nbk/Blk、Bad、Bid、BimL, S, EL/BodL, M, S、Noxa/APR、Puma等のアポトーシス促進遺伝子を、血管新生抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAとしては、アンジオスタチン、エンドスタチン、Flk-1、Flt-11、FLT4、Tie1、Tie2などのタンパク質をコードするDNAを、癌転移抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAとしては、マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)阻害剤、ウシラクトフェリン(bLF)などのタンパク質をコードするDNAを、癌抑制作用をもつタンパク質をコードするDNAとしては、p21、p16、p15、p53等の細胞周期抑制物質や、p53、Rb、IRF-1、APC等の細胞増殖抑制物質をコードするDNAを、それぞれ具体的に例示することができるがこれらに限定されるものではない。

【0028】

上記目的タンパク質をコードするDNAとして、EGFPcDNAや、ルシフェラーゼ(Luciferase)遺伝子等のマーカータンパク質をコードする遺伝子を挙げることができ、これらマーカータンパク質を発現することができる細胞特異的発現複製ベクターは、スクリーニングや各種実験等においてきわめて有用である。

【0029】

本発明の成体では正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの作製に用いられるウイルスベクターの骨格としては、骨・軟部肉腫、平滑筋肉腫、消化

管ストローマ腫瘍（GIST）、悪性中皮腫、悪性繊維性組織球腫、繊維肉腫、悪性髄膜腫、神経鞘腫等の腫瘍細胞又は腫瘍新生血管の増殖平滑筋あるいは血管周細胞に感染又は遺伝子を導入し発現することができるベクターが好ましく、かかるベクターとしては、染色体、エピソーム、リボソーム及びウイルスに由来する発現ベクターを例示することができるが、SV40のようなパポバウイルス、ワクシニアウイルス、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルスベクター、鶏痘ウイルス、仮性狂犬病ウイルス、レトロウイルス由来のベクター、単純ヘルペスウイルスベクター（HSVベクター）等のウイルスベクターが好ましく、中でも、HSVベクターとアデノウイルスベクター、特に条件付き複製可能型HSVベクター、又は条件付き複製可能型アデノウイルスベクターが、遺伝子発現の高効率性、増殖細胞特異的細胞傷害活性などの点で好ましい。上記条件付き複製可能型HSVベクターとして、例えば、リボヌクレオチドリダクターゼ（Ribonucleotide reductase）をコードするDNAが欠失しているベクターを用いることにより、本発明の成体正常細胞に作用せず、ベクターの複製と遺伝子の発現を制御できる細胞特異的発現複製ベクターを好適に作製することができる。

【0030】

本発明の成体では正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの発現複製方法としては、前記の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織、好ましくは骨・軟部肉腫、平滑筋肉腫、消化管ストローマ腫瘍（GIST）、悪性中皮腫、悪性繊維性組織球腫、繊維肉腫、悪性髄膜腫、神経鞘腫等の腫瘍が生じている組織の他、ステント留置後や臓器移植後の血管狭窄組織若しくは動脈狭窄組織、腎炎組織又は線維症組織、又はこれら組織を含む器官に直接導入又は腫瘍を養う血管系から注入、又は血管内にステント等を用いて直接注入し発現複製させる方法、又は腫瘍新生血管の増殖平滑筋を攻撃の標的とする場合は、悪性固形腫瘍の種類がいかなるものであれ、直接導入又は腫瘍を養う血管系から注入し、発現複製させる方法であれば、特に制限されるものでない。また、本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの遺伝子、タンパク質又はペプチドの発現複製・抑制方法としては、前記の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、上記生体細胞組織に導入して発現複製

させ、その後の所望の時期に、例えば、アシクロビル (aciclovir)、ガンシクロビル (ganciclovir) 等の抗ウイルス薬を用いて、細胞特異的発現複製ベクターの発現複製を抑制する方法であれば、特に制限されるものでない。そしてまた、本発明の治療薬としては、前記本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを有効成分として含むものであればどのようなものでもよく、かかる治療薬としては生体細胞組織、好ましくは上記悪性腫瘍、線維症、増殖性血管病変、増殖性糸球体腎炎等に対する治療薬を具体的に例示することができる。

【 0 0 3 1 】

本発明の線維症及び悪性腫瘍の治療方法としては、前記本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、肺、肝臓などの線維症組織または乳がん、胃がん、膵臓がんなどの悪性腫瘍組織に導入し、遺伝子、タンパク質又はペプチドを発現させる方法であれば特に制限されず、なかでも、増殖筋線維芽細胞だけを選択的に破壊する方法や、腫瘍新生血管の増殖平滑筋又は血管周細胞だけを選択的に破壊する方法が好ましい。悪性腫瘍が生じている組織に導入する方法としては、悪性腫瘍に上記細胞特異的発現複製ベクターを直接注入する方法又は腫瘍を灌流する血管系に注入する方法を好適に例示することができる。本発明の増殖性血管病変の治療方法としては、前記本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、血管狭窄組織又は動脈硬化組織、糖尿病性網膜症組織に導入し、遺伝子、タンパク質又はペプチドを発現させる方法であれば特に制限されず、なかでも、増殖平滑筋細胞又は血管周細胞だけを選択的に破壊する方法を好適に例示することができる。また、本発明の増殖性糸球体腎炎の治療方法としては、前記本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、腎炎組織に導入し、遺伝子、タンパク質又はペプチドを発現させる方法であれば特に制限されず、なかでも、増殖メサングウム細胞だけを選択的に破壊する方法を好適に例示することができる。そして、本発明の上記治療方法においては、細胞特異的発現複製ベクターの発現複製を、治療終了後等の所望の時期に、抑制することを大きな特徴としている。

【 0 0 3 2 】

本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターの生体内分布を検出する方法としては、前記本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを、生体細胞組織に導入し、発現複製させて前記細胞特異的発現複製ベクターによるチミジンキナーゼ活性を検出・測定することを特徴とし、具体的には、 ^{124}I でラベルしたウラシル誘導体 F I A U を生体に投与し、Positron Emission Tomographyにより ^{124}I を検出・測定することにより、細胞特異的発現複製ベクターの生体内分布を検出することができる(Nature Med. 7, 859-863, 2001)。

【 0 0 3 3 】

本発明の細胞特異的発現複製ベクターの製造方法としては、細胞特異的に発現する遺伝子の転写開始制御領域が活性化され得る細胞又は該遺伝子を発現する細胞、好ましくは I C P 4 (-) 細胞に、前記本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを含む相同組み換え後のウイルス混合液を感染させ、ベクター内に組み込んだ遺伝子の発現を指標にして、限界希釈法によって単一クローンにまで精製するスクリーニング方法であれば特に制限されるものではなく、かかるスクリーニングによる本発明の細胞特異的発現複製ベクターの製造方法の確立により、前記本発明の成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターをはじめて得ることができる。

【 0 0 3 4 】

【実施例】

以下に、実施例を掲げてこの発明を更に具体的に説明するが、この発明の範囲はこれらの例示に限定されるものではない。

実施例 A [方法と材料]

A - 1 (細胞、培養方法、抗体、及びウイルス)

ヒト平滑筋肉腫細胞株 S K - L M S - 1 (H T B - 8 8)、及びペロ細胞 (C C L - 8 1) は、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション (American T y p e C u l t u r e C o l l e c t i o n) から購入した。ヒト骨肉腫細胞株 O S T (R C B O 4 5 4) は、理研ジーンバンク (R I K E N G E N E B A N K) から購入した。 I C P 4 遺伝子を導入したペロ細胞、 E 5 細胞は、 N . D e l u c a (U n i v e r s i t y o f P i t t s b u r g h

School of Medicine, Pittsburgh) から供与されたものを用いた。SK-LMS-1 は 1 mM のピルビン酸ナトリウムを添加したイーグル MEM で培養した。OST、ペロ及び E5 細胞は、DMEM で培養した。全ての培地には、最終濃度で 10 % の熱不活性化ウシ胎仔血清 (Upstate Biotechnologies)、2 mM の L-グルタミン、100 unit/mL のペニシリン、及び 100 µg/mL のストレプトマイシンがそれぞれ含まれている。また、上記全ての細胞は、加湿された 5 % の CO₂ 条件下で 37 °C にて培養した。

【 0 0 3 5 】

HSV-1 又は HSV-2 の ICP4 タンパク質に対するモノクローナル抗体 (clone No.1101) は、Goodwin Institute for Cancer Research のものを用いた。イムノブロット分析は、文献 (Int. J. Cancer 79, 245-250, 1998) 記載の方法と同様に行った。化学ルミネッセンス (ECL; Amersham Pharmacia Biotech 社製) は、製造者のプロトコルに従って結合抗体を視覚化した。また、それぞれ ICP4 導入 Vero E5 細胞又はペロ細胞に低多重度で感染させることにより生成した、HSV の ICP4 欠損変異体 d120 (J. Virol. 56, 558-570, 1985) 及び HSV の ICP6 (ribonucleotide reductase) 欠損変異体 hrR3 は、N. Deluca 又は S. Weller 博士 (University of Connecticut Health Center, Farmington) からそれぞれ供与されたものを用いた。

【 0 0 3 6 】

A-2 (RNA の調製と RT-PCR 分析)

全 RNA は Isogene RNA extraction kit (Nippon Gene 社製) を用いて培養した細胞又は組織からそれぞれ抽出し、文献 (Int. J. Cancer 79, 245-250, 1998) 記載の半定量的 RT-PCR 分析を行った。PCR 増幅の条件としては、94 °C で 40 秒間変性させ、60 °C で 30 秒間アニーリングし、72 °C で 90 秒間伸長反応させるというサイクルを 30 回繰返し行った。ヒトカルボニンプライマーとしては、5'-gagtgtgcagacggaacttcagcc-3' [フォワードプライマー 1 (FP1); nt# 10-33 GenBank D17408; 配列番号 6] と 5'-gtctgtgcccagcttgggtc-3' [リバースプライマー 1 (RP1); nt# 660-680; 配列番号 7] を、コントロールとしての GAPDH (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase)

のプライマーとしては、5'-cccatcaccatcttccagga-3' [フォワードプライマー 2 (FP2) ; nt# 342-360 ; 配列番号 8] と 5'-ttgtcataccaggaaatgagc-3' [リバースプライマー 2 (RP2) ; nt# 1052-1070 ; 配列番号 9] を用いて、それぞれ 671 bp と 731 bp の DNA を増幅させた。

【0037】

A-3 (ヒトカルボニンプロモーターの単離)

文献 (J. Biochem. 120, 18-21, 1996) 記載の方法に従い、ヒトゲノム λ EMBL3 ファージライブラリーのスクリーニングを行って、ヒトカルボニン遺伝子の 5' 上流側を含むゲノムクローンを単離した。5' 側が欠失した断片である p-1159 Luc、p-385 Luc、p-343 Luc、p-310 Luc、p-299 Luc、p-288 Luc、p-260 Luc、p-239 Luc、p-219 Luc、p-201 Luc、p-176 Luc、p-153 Luc をゲノムクローンを鋳型にして PCR 法で増幅することにより作製した。番号は、以後 +1 と表示される ATG 翻訳開始コドンの上流に位置する DNA 断片の 5' 末端を示している。欠失したこれらの断片は +73 の位置に共通の 3' 末端を有している。DQS-2000L DNA sequencer (SHIMADZU 社製) を製造者のプロトコールに従って使用し、該クローン断片のヌクレオチド配列を決定し、その配列は文献 (J. Biochem. 120, 18-21, 1996) に記載の配列 (DDBJ/GenBankTM/ EMBL database ; accession No. D85611) と同一であることを確認した。文献 (Cancer Res. 61, 3969-3977, 2001) に記載の方法によって、最小の発現調節領域 (-260 ~ +73) を同定した。

【0038】

A-4 (トランスフェクション及びビルシフェラーゼ分析)

トランスフェクションする 24 時間前に、あらかじめ培養した細胞を分割し、プレート上に播いた。製造者のプロトコールに従い 1 ウエル当たり、1.2 μ g のプロモータープラスミドと、0.3 μ g の pCAGGS/ β -gal 関連プラスミドと、3.75 μ l の FuGENETM6 トランスフェクション試薬 (Roche 社製) とを 6 ウエルディッシュに注入し、細胞 (5×10^4) をトランスフェクションした。トランスフェクションの 24 時間後、100 μ l / ウエルの細胞溶解緩衝液 (Pi

caGeneTM ルシフェラーゼ分析システム、Toyo Ink社製) 中で細胞を回収した。
 4℃で12000g×5分間の遠心分離を行った後、上清(20μl又は30μl)をルシフェラーゼアッセイ及びβ-ガラクトシダーゼアッセイにそれぞれ使用した。ルシフェラーゼ活性はBLR-201 luminescence reader (Aloka社製)を用いて測定した。β-ガラクトシダーゼアッセイは、文献(J. Biochem. (Tokyo) 122, 157-167, 1997) 記載の方法に準じてβガラクトシダーゼ酵素分析システム(Promega社製)を用いて行った。再現性を確認するため、全実験は最低三回繰り返した。細胞抽出物のβ-ガラクトシダーゼ活性を測定することによりトランスフェクション効率を決定し、その値に応じて、ルシフェラーゼ活性(光ユニット)を補正した。SV40エンハンサー及びSV40プロモーターを含むpSV2-Luc遺伝子の発現を比較することにより、種々の細胞株のトランスフェクション効率を評価した。データは、pSV2-Lucの値に対してノーマライズした吸光度±S.E.を%として表している。

【0039】

A-5 (ウィルスの調製)

ICP4のコード領域を含むpGH108 (J. Virol. 56, 558-570, 1985) 由来の4.1kbの平滑末端SalI-MseI断片 (Johns Hopkins School of MedicineのHayward博士より提供) を、pAMP1プラスミドにクローニングした333bpヒトカルポニンプロモーター(-260~+73)の下流の平滑末端BamHIサイトに挿入し、及びかかるプラスミドのSmaIサイトにヒト4F2重鎖転写エンハンサー (Mol. Cell Biol. 9, 2588-2597, 1989) (Harvard Medical SchoolのLeiden氏より提供) の444bpのNotI断片をサブクローンした。このpAMP1/CALP-ICP4プラスミドの3'側にあるHinIIIサイトを平滑化し、pIRES2-EGFPプラスミド (Clontech社) を、BamHIとAflIIとを用いて二重消化させることにより得られた1576-bp断片をサブクローンした。このBamHI-AflII断片は、IRES配列 (米国特許第4937190号明細書) とEGFP配列 (米国特許第5625048号及び第5804387号明細書) およびSV40由来ポリAシグナルから構成されている。次に、pAMP1/CALP-ICP4-IRES2-E

GFPプラスミドをEcoRIとSphIとを用いて二重消化させることにより得られた6.7-kb断片を平滑化し、pKX2βG3組換えベクターのStuI平滑末端サイトにサブクローニングした(pKX2βG3/CALP-ICP4-IRES2-EGFP)。pKX2βG3組換えベクター(Conneticut大学のWeller氏より提供)は、ICP6コード配列の2.3-kbXhoI断片(pKpX2)とそのBamHIサイトに挿入された3.0-kbの大腸菌(*Escherichia coli*)由来のLacZ配列及びpUC19のバックボーンからなる(J. Virol. 62, 196-205, 1988)。

【0040】

続いて、上記プラスミドpKX2βG3/CALP-ICP4-IRES2-EGFPをXhoIサイト(pKX2βG3の5'側ICP6配列の5'側にあるXbaIサイトと3'側ICP6配列の3'側にあるHindIIIサイトをともにXhoIサイトで置換したもの)で線状化し、pUC19配列を除去したpRRΔ-CALP-ICP4-IRES2-EGFPとd120ウイルスDNAとを、製造者のプロトコルに従ってLipofectamineTM(GIBCO/BRL社製)を使用し、6ウェル組織培養プレート中のICP4cDNAを導入したVer o E 5細胞(2.5×10⁵/well)のサブコンフルエント単層培養にコトランスフェクションした。トランスフェクション3時間後に20%DMEM培養液1mlを添加し、96時間後まで、4-hydroxymethylbenzoic acid (HMB A) 0.5mg/mlを含む前記培養液(10%FBS/DMEM)で培養した。プラーク形成を確認した後、HMB Aを含まない10%FBS/DMEMで24時間培養した。500μl/ウェルのコールドウイルスバッファー(150mMのNaClを含む20mMのTris-HCl; pH7.5)に細胞を懸濁し、凍結保存した。

【0041】

超音波処理(30秒間を3回)を組み合わせた凍結処理と解凍処理を三回行い、上記懸濁液を溶解した。懸濁液を段階的に希釈し、96ウェル組織培養プレートのサブコンフルエント単層培養SK-LMS-1細胞に感染させた。感染後96時間1ウェルあたり100μlの11.3μg/mlのヒトIgG(Jackson ImmunoResearch Lab.社製)を含む1%FBS/DMEMで培養した。プラーク

形成を確認し得たウエルを蛍光顕微鏡下でのGFPの発現を指標にしてスクリーニングした。GFP陽性のプラークを含むウエルのSK-LMS-1単層培養細胞を前記培養液100 μ lに懸濁し、そのうちの6 μ lを用いて、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル- β -D-ガラクトピラノシド(X-gal)を基質にした β ガラクトシダーゼ酵素活性を、 β ガラクトシダーゼ酵素分析システム(Promega社製)を用いて測定した。 β ガラクトシダーゼ酵素活性陽性のウエルのSK-LMS-1細胞懸濁液を5000回転で5分間遠心し、ペレットを100 μ l/ウエルのコールドウイルスバッファーに懸濁した。96ウエル組織培養プレートを用いた同様の限界希釈感染・ β ガラクトシダーゼ酵素活性測定法をVer o E5細胞を用いてさらに2回繰り返し、組換えウィルスベクターd12・CALP・ Δ RRを単一のプラークとして精製した。ウィルスDNAを精製した後、制限酵素XhoIで消化し、ICP6 cDNAのXhoI断片(2.3-kb)をプローブにしたサザンブロット分析によりリボヌクレオチド還元酵素遺伝子座(ICP6 or RR-locus)での組換えを確認し得た(図1)。

【0042】

10~20個の150cm²/tissue culture flasks (IWAKI CLASS社製)中のE5細胞に感染させ、48時間後に剥離した細胞を回収することにより、ウィルスを調製した。4℃で5分間、400 \times gで遠心分離を行って細胞を収集し、10mlのコールドウイルスバッファー(150mMのNaClを含む20mMのTris-HCl; pH7.5)に懸濁した。超音波処理(30秒間を3回)を組み合わせた凍結処理と解凍処理を三回行い、上記細胞を溶解した。4℃で5分間、1500 \times gで遠心分離を行ったあと、その上清に対してさらに4℃で45分間、15000 \times gで遠心分離を行った。その結果得られたペレットをコールドウイルスバッファーに懸濁し、Ver o E5細胞におけるプラークアッセイにより精製したd12・CALP・ Δ RRの力価を決定した。

【0043】

A-6 (インビトロでの細胞崩壊分析及びウィルス複製分析)

1%の熱不活性FBS/PBS中で、感染多重度(MOI)が0.01~0.001 pfu/cellで、6ウエル組織培養プレート中の細胞のサブコンフル

エント単層培養にd12・CALP・ΔRRウイルスを感染させた。かかる感染細胞を37℃で1時間インキュベートし、その後、1%のFBSと11.3 μg/mlのヒトIgG (Jackson ImmunoResearch Lab.社製)を含む前記培地で培養した。感染の48時間後、プラーク/ウェルの数を計測した。ウイルス複製分析のために、12ウェル組織培養プレート中のSK-LMS-1細胞又はOST細胞の単層培養(2×10⁵細胞/well)に、1%のFBS/PBS中にて、感染多重度(MOI)が0.1となるようにd12・CALP・ΔRRを感染させた。接種したウイルスを1時間後に取り除き、上記細胞を前記培地でインキュベートした。所定の時間(12時間、24時間、48時間)に、100 μlのウイルスバッファーを用いて感染細胞をウェルから剥がした。細胞懸濁液(1 μl)を10⁻³、10⁻⁴及び10⁻⁵に希釈し、その後Ver o E5細胞におけるウイルスの力価を決定した。

【0044】

A-7 (インビトロでのウイルス複製の抗ヘルペスウイルス剤ガンシクロビル(ganciclovir)に対する感受性分析)

1%の熱不活性FBS/PBS中で、感染多重度(MOI)が0.01 pfu/cellで、24ウェル組織培養プレート(5×10⁴/well)または6ウェル組織培養プレート(2.5×10⁵/well)中のSK-LMS-1細胞のサブコンフルエント単層培養にウイルスを感染させた。かかる感染細胞を37℃で1時間インキュベートし、その後、1%のFBSと11.3 μg/mlのヒトIgG (Jackson ImmunoResearch Lab.社製)、種々の濃度(0~1 μg/ml)のガンシクロビル(ganciclovir) (和光純薬社製)を含む前記培地で培養した。感染の48時間後に1ウェルあたりのプラーク数を計測した。

【0045】

ICP4発現のイムノブロット分析のため、SK-LMS-1細胞及びOST細胞に、感染多重度(MOI)が0.01となるようにd12・CALP又はウイルスバッファーのみをそれぞれ感染させ、22時間培養したのち回収した。同量のタンパク質を9%のSDS-PAGEゲル電気泳動にかけ、ニトロセルロース膜(Bio-Rad社製)に移した。5%のスkimミルク(DIFCO Laboratories社製

）を用いて、膜を室温で2時間ブロッキングし、その後、抗ICP4抗体（希釈率1：1000）を用いて、4℃で一晩インキュベートした。

【0046】

A-8（統計学的分析）

無対のStudent's t-testを使って、統計的差異を確認した。差異は $p < 0.05$ で、統計的に有意であると考えられた。

【0047】

実施例B【結果】

B-1（カルボニン陽性細胞における組換えHSVベクターのインビトロでの選択的複製）

カルボニン陽性細胞及び増殖細胞中で選択的に複製するHSVベクターを構築するため、4F2エンハンサー／-260カルボニンプロモーター／ICP4／IRES-EGFPを含むDNA断片を、ICP4⁻HSV変異体d120（J. Virol. 56, 558-570, 1985）のRR(ICP6)遺伝子座（U_L36）に相同組み換え法を用いて挿入し、d12.CALPΔRRを作製した。d12.CALPΔRRは、ICP6プロモーターの制御下にβ-ガラクトシダーゼを発現し、カルボニンプロモーターの制御下にICP4タンパク質とEGFPたんぱく質を発現させることが可能である（図1）。カルボニン発現ヒト平滑筋肉腫細胞株（SK-LMS-1）とカルボニン非発現ヒト骨肉腫細胞株（OST）を使用して、d12.CALPΔRRのウィルス複製の細胞選択性を評価した。

【0048】

ウィルス力価を感染多重度0.1（ 2×10^5 cells/well）のシングルステップグロースアッセイで評価した。d12.CALPΔRRは、カルボニン陽性SK-LMS-1細胞中で複製したが、d12.CALPΔRRの力価は感染の72時間後のカルボニン陰性OST細胞中ではSK-LMS-1細胞に比べて $1/10^5$ 程度に減少した（図2）。両細胞の増殖速度は同程度であった。感染22時間後の細胞抽出物のイムノブロット分析を行った結果、SK-LMS-1細胞ではICP4タンパク質が発現しているが、OST細胞ではICP4タンパク質が発現していないことがわかった。これはウィルス複製分析結果と一

致していた。これに対し、相同組み換えの親株である d120 ウイルスベクターは、SK-LMS-1 及び OST の培養物において子孫ウイルスの産生はまったく見られなかった。

【0049】

6 ウェルディッシュ中の SK-LMS-1 細胞に d12. CALPΔRR を感染させ、感染の 96 時間後に、X-gal アガロースオーバーレイで β-ガラクトシダーゼ発現細胞を青色に染色し、同時に倒立型蛍光顕微鏡で、EGFP の発現を検証した。崩壊し死滅しつつある腫瘍細胞に β-ガラクトシダーゼが発現し、その周囲の生細胞に EGFP が発現していることが確認できた (図 3)。

1 個の細胞に、両者の発現が同時に存在する例も多数観察された。

【0050】

B-2 (組換え HSV-1 ベクターの抗ヘルペスウイルス剤ガンシクロビル(ganciclovir)に対する感受性)

d12. CALPΔRR をヒト悪性腫瘍の治療に応用する場合、最も重要な特性は、TK 遺伝子をインタクトな状態でもつため、抗ヘルペスウイルス剤であるガンシクロビル(ganciclovir)に感受性を示すことである。24 ウェル ($5 \times 10^4 / \text{well}$) ディッシュ中の SK-LMS-1 細胞に、種々の濃度 ($0 \sim 100 \text{ ng/ml}$) のガンシクロビル(ganciclovir)存在下で、d12. CALPΔRR を多重感染度 0.01 で感染させ、感染の 48 時間後に、X-gal を基質にして染色し、1 ウェルあたりの β-ガラクトシダーゼ陽性のプラーク数を計測した。また、6 ウェルディッシュ中の Vero E5 細胞 ($2.5 \times 10^5 / \text{well}$) に $1 \mu\text{g/ml}$ のガンシクロビル(ganciclovir)存在下と非存在下で、d12. CALPΔRR を感染させ、感染の 48 時間後に、X-gal を基質にして染色した (図 4)。

【0051】

SK-LMS-1 細胞、ICP4cDNA を導入した Vero E5 細胞共に、ガンシクロビル(ganciclovir)の存在下で d12. CALPΔRR の複製が抑制された。SK-LMS-1 細胞では、 40 ng/ml のガンシクロビル(ganciclovir)存在下で完全に抑制された。d12. CALPΔRR は、野性型ウイルスよりも同

薬剤に感受性が高いことが報告されている (Cancer Res. 54, 3963-3966, 2001) 複製可能型 HSV-1 変異体 hrR3 と同等のガンシクロビル (ganciclovir) に対する感受性を示した。この結果は、d12, CALPADRR が治療後にガンシクロビル (ganciclovir) またはアシクロビル (aciclovir) でウイルス感染細胞を除去できる安全策を備えていることを示している。

【0052】

【発明の効果】

間葉系細胞由来の悪性腫瘍すなわち肉腫は、化学療法や放射線療法に抵抗性で、外科的切除後も再発を繰り返し、最終的には肺、肝、腹膜などに転移し予後が悪い。わが国における症例数は、消化器外科領域のストローマ腫瘍 (GIST)、整形外科領域の骨・軟部肉腫を中心に婦人科領域の平滑筋肉腫、胸部・消化器外科領域の悪性中皮腫、脳外科領域の繊維肉腫、悪性髄膜腫、悪性神経鞘腫等を合わせて年間5000例前後の初発例がある。全がんのおよそ1~2%と少ないものの、若年者にも多発し化学療法に感受性のある一部の症例を除いては有効な治療法がないことから、新治療法の開発を切望する社会的要請が強い。肉腫の病因、病態に関連する遺伝子解析は、骨肉腫や平滑筋肉腫で p53 と Rb 遺伝子、GIST で KIT 遺伝子の変異、Ewing 肉腫や滑膜肉腫、脂肪肉腫で融合遺伝子の存在が報告されているが、まだ治療に応用できる段階にはない。また、これまでの動物実験で、p53 や サイトカイン、自殺遺伝子である単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼ (HSV-tk) などを種々のベクターを用いて肉腫細胞に直接導入する方法が試みられたが、十分な治療効果が得られていない。

【0053】

遺伝子治療は、がん細胞に導入する遺伝子の細胞選択的な作用や発現プロモーターの活性、ウイルスベクターの感染導入など、いろいろなレベルでがん細胞選択性を高めることが可能であり、肉腫に対しても有望な治療法として注目されている。実際、オステオカルシンのプロモーターを用いて HSV-tk を複製能力のないアデノウイルスベクターで骨肉腫選択的に発現させることにより、静脈内投与でも肺転移巣を有意に抑制し得ることが報告された (Cancer Gene Ther. 5, 274-280, 1998)。しかし、オステオカルシンは分化段階にある正常な骨芽細胞

にも発現しているので、導入遺伝子の発現を制御するだけでは、がん細胞選択性を高めるには不十分である。加えて、分化のマーカー遺伝子のプロモーターによって細胞選択性を高めることは、一方でベクターの汎用性を低下させることであり、多種多様な組織、細胞に由来し、それぞれの症例数が限られている肉腫の場合、ベクター開発の費用対効果の面で不利である。

【 0 0 5 4 】

さらに、これまでの肉腫に対する実験的遺伝子治療に用いられた複製能力を欠如したウイルスベクターやリポソームベクターでは、すべてのがん細胞に治療遺伝子を導入することは不可能である。したがって、動物実験で延命効果は得られるものの持続的な抗腫瘍効果は期待できない。また、がん細胞への遺伝子導入効率が低ければ、それだけ大量のウイルスベクターが必要であり、過剰な免疫反応やアレルギー反応が起きる危険性も高まる。

【 0 0 5 5 】

難治性肉腫の治療には、何か従来の方法とは異なる全く新しいアプローチが必要であると考えられてきたが、その手がかりは得られていなかった。本発明の実施例はかかる要望等に応えうるものであり、本発明によると、肉腫に限らず悪性腫瘍等の特定の細胞で複製し腫瘍細胞を破壊しつつ特異的に治療遺伝子を発現する、正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを提供することができる。治療終了後に薬剤でウイルスの複製を停止させることができる安全策を備えたかかる細胞特異的発現複製ベクターを用いることにより、世界で最初のヒトを対象にした細胞選択的な発現複製ベクターを用いた遺伝子治療が可能となる。

カルボニン遺伝子は成体では主として平滑筋細胞に発現しており、特に血管平滑筋細胞の増殖は、腫瘍血管新生やステント留置後の血管狭窄、糖尿病性網膜症などの増殖性血管病変の原因であるため、本発明によって提供されるカルボニンプロモーターをもつ平滑筋細胞特異的発現複製ベクターで、増殖する平滑筋細胞を選択的に破壊することにより、これらの疾患をも治療することが可能である。中でも、本発明によってはじめて可能となる腫瘍血管平滑筋を選択的に破壊する治療法は、すべての固形癌に有効ながん治療法として、画期的な効果をもたらす可能性がある。さらに、カルボニンを発現するメサングウム細胞の増殖によって

おこる増殖性糸球体腎炎や、カルボニンを発現する筋線維芽細胞の増殖によっておこる肺や肝臓などの線維症に対する治療剤としても有効に作用し得る可能性がある。

【 0 0 5 6 】

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION

<120> Cell specific express replication vector

<130> B08P01

<140>

<141>

<160> 9

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 41

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 1

gaaacaatga cacaatcagc tcccaatacc aagggcctga c

41

<210> 2

<211> 260

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 2

```

gaaacaatga cacaatcagc tccaatacc aagggcctga catcacaagg ggaggggaag 60
gcagctgagg ttgtgggggg aggtgccccg ccccttgga ggcccctaca gccaatggaa 120
cggcccctgga agagacccgg gtcgcctccg gagcttcaaa aacatgtgag gaggaagag 180
tgtgcagacg gaacttcagc cgctgcctct gttctcagcg tcagtgccgc cactgcccc 240
gccagagccc accggccagc                                     260
    
```

<210> 3

<211> 333

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Region consist
of human calponin gene promoter and its structural
gene fragment

<400> 3

```

gaaacaatga cacaatcagc tccaatacc aagggcctga catcacaagg ggaggggaag 60
gcagctgagg ttgtgggggg aggtgccccg ccccttgga ggcccctaca gccaatggaa 120
cggcccctgga agagacccgg gtcgcctccg gagcttcaaa aacatgtgag gaggaagag 180
tgtgcagacg gaacttcagc cgctgcctct gttctcagcg tcagtgccgc cactgcccc 240
gccagagccc accggccagc atgtcctctg ctcacttcaa ccgaggccct gcctacgggc 300
    
```

tgtcagccga ggtaagaac aaggtagggg tgg

333

<210> 4

<211> 445

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 4

gtgagtgcag cgcgccccg tcccgggtac ctccggttga atctggtggc ttgcaccgac 60
 cccctcccct gtccccagac ggatctagat ggttcttccc tccatcccgt accgacgact 120
 gtccccctt cccccacccc ctccccggca cattgtcctt cctcctttc ttgaagaaa 180
 gccgaccgc cctcactcc gtcacgaggg tgggtgactc agcgtcctcc ttccccgcgg 240
 cgccagaagc cagttgcaac cggtttctga agtaatgtgc aggactcctt acatcagctc 300
 ctctgagtct cgtgattcag cttgcctcc ctctctcccc ctttgcccc tccccgtccc 360
 acccttaggc gctgggagaa gggagggtgg ggaggtcagg ggcctctcag aggggcctca 420
 cttgttaacc cagcccccat ttcag 445

<210> 5

<211> 455

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 5

ggatcccatg tcccatcaga gctaaaagcc ccaggaggag aggggtggctg gtttgtcccc 60
 acaaaccct gggattcccg gtcccccagc cccttgcccc tctctccagc cagactctat 120
 tgaactcccc ctcttctcaa actcggggcc agagaacagt gaagtaggag cagccgtaag 180
 tccgggcagg gtctgtcca taaaaggctt ttcccgggcc ggctccccgc cggcagcgtg 240

ccccgccccg gcccgctcca tctccaaagc atgcagagaa tgtctcggca gccccggtag 300
actgctccaa cttggtgtct ttcccaaat atggagcctg tgtggagtca ctgggggagc 360
cgggggtggg gagcggagcc ggcttcctct agcagggagg gggccgagga gcgagccagt 420
gggggaggct gacatcacca cggcggcagc ccttt 455

<210> 6

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:FP1

<400> 6

gagtgtgcag acggaacttc agcc 24

<210> 7

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:RP1

<400> 7

gtctgtgccc aacttggggt c 21

<210> 8

<211> 20

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:FP2

<400> 8

cccatcacca tcttccagga

20

<210> 9

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:RP2

<400> 9

ttgtcatacc aggaaatgag c

21

【図面の簡単な説明】

【図1】

d12・CALPARR作成の手順とその構造を示す図である。左は、pKpX2 (ICP6のXhoI断片) とICP6のStuI-XhoI断片をDIG

標識プローブにしたサザンブロットの結果を示す。d120は相同組み換えを行った親株で、2つのICP4遺伝子とともに欠失したKOS株由来の変異体である。hrR3は、野性型であるKOS株のRibonucleotide reductase (ICP6) 遺伝子のBamHIサイトにLacZ遺伝子が挿入され (pKX2βG3)、結果としてICP6を欠失している。

【図2】

インビトロでのカルボニン陽性悪性腫瘍細胞 (SK-LMS-1 平滑筋肉腫) に対するd12・CALPΔRRの選択的細胞傷害活性を示す図である。左上は、RT-PCRでカルボニンmRNAの発現をみたもので、OST骨肉腫細胞では、カルボニンはほとんど発現していない。右はブランクのX-Gal染色である。

【図3】

インビトロでのカルボニン陽性悪性腫瘍細胞 (SK-LMS-1 平滑筋肉腫) におけるd12・CALPΔRRの複製をLacZ遺伝子の発現を示すX-Gal染色で示し、カルボニンプロモーターの制御下に発現するEGFP蛋白を蛍光顕微鏡で観察した図である。LacZとEGFPが共に発現している細胞を多数観察することができる。


【図4】

インビトロでのカルボニン陽性悪性腫瘍細胞 (SK-LMS-1 平滑筋肉腫) およびICP4 cDNAを導入したVeroE5細胞におけるd12・CALPΔRRの複製と細胞傷害活性のガンシクロビル(ganciclovir)感受性を示す図である。左はガンシクロビル(ganciclovir)高感受性のhrR3と比較したものであり、右は、チミジンキナーゼを欠失するd12・CALP (特願2001-143999) と比較したもので、1 μg/mlのガンシクロビル(ganciclovir) 存在下で細胞傷害活性をみたものである。d12・CALPはガンシクロビル(ganciclovir)に感受性がない。

【書類名】


図面

【図 1】




【図2】

Single Step Growth Assay




【図3】

SK-LMS-1 平滑筋肉腫



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 悪性腫瘍等の治療に用いるために、悪性腫瘍等の特定の細胞で特異的に遺伝子を発現しつつ複製し、かつ正常細胞には損傷を与えないような、細胞特異的発現複製ベクター、特にその発現複製後の所望の時期に発現複製を抑制することができるベクターを構築し、悪性腫瘍等の特定の生体細胞に導入し発現させて治療する方法などを提供すること。

【解決手段】 細胞特異的に発現するヒトカルポニン遺伝子の転写開始制御領域を取得し、これをICP4等のウイルスの複製関連遺伝子上流に連結し、前記ウイルスの複製関連遺伝子にIRESを介してアポトーシス関連遺伝子等のタンパク質遺伝子をコードするDNAを連結し、チミジンキナーゼ遺伝子はインタクトな状態で残したものを、ウイルスDNAに組み込んで、成体正常細胞に作用しない細胞特異的発現複製ベクターを構築し、この構築したベクターを悪性腫瘍細胞に導入させる。

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [396020800]

1. 変更年月日	1998年 2月24日
[変更理由]	名称変更
住 所	埼玉県川口市本町4丁目1番8号
氏 名	科学技術振興事業団

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.